

למרות ריבוי טיפול הפסיכה, פחות נשים מצליחות לולדת

דו אבן (אלא) 29.1.13

הטיסכויים ללודת בעקבות הטיפולים הולכים ופוחתים ככל שהמטופלת מבוגרת יותר. מצא הממחקר העלו כי ב-2010 דוחו סיבויי הצלחה של 23.5% בקרוב מטוטנות בנות 20-25, שעלו ל-26.3% בקרב בנות 25-30. לעומת זאת, בקרב בנות 30-35 ירדו הטיסכויים בקרב בנות 35-40 ל-13.2%. לעומת זאת, בקרב בנות 35-40, בקרב מטופלות בנות 40-45 דוחו רק 6.4% הצלחה. עיבוד מפורט יותר של הנתוניים בגילאי 40 עד 45 העלה כי נכון ל-2010, שיעורי הצלחה של טיפול הפסיכה בגיל 40 עמדו על 12%, וירדו בגיל 41 ל-8.5% ובגיל 42 ל-5.5%. בגיל 43 הם הוסיפו לרדת ל-3.1% ובגיל 44 ירדו שיעורי ל-1.7% בלבד.

בטיפול הפסיכה שכללו החזרת ביציות מופרות שהופשו הושגה הצלחה מועטה

משרד הבריאות מפרסם מדי שנה את שיעורי הצלחה של הטיפולים. על רקע העיכוב במיזום של מכון גרטנר, שטבקש להקים מאגר נתונים שיתעד את אחוזי ההצלחה בטיפול הפסיכה בכלל,

יחידות הפסיכה בכתי החולמים, הנתונים המדויקים במחקר הם המפורטים ביותר שהתפרסמו עד כה בארץ.

ד"ר שחר קול, אחראי רפואי נשים במחוז צפון מכבי ומומחה לפריון במכון לבדיות האישה של הקופה בחיפה, עמד בראש צוות החוקרים יחד עם ד"ר טל סלע. "המסקנה העיקרית שלנו היא שבישראל מבצעים מריד שננה, אף טיפול הפסיכית שלנו שסיכויי הצלחה שלהם הם מראש קטנים מואה, באופן שאין לו אה ורע בעולם", אמר קול, "יש נשים שמשיכות לצעז טיפולים לאחר 20 מחוזרי טיפול, וכך אחוזי ההצלח-

להה הכלולים יורדים". סל הבריאות בישראל כולל טיפול הפסיכה במימון קופות החולים,

לים עד גיל 45 ועוד שני ילדים. ביוני 2012 דוחה ב"הארץ" כי משרד הבריאות בוחן אפשרות למימון ציבורי של טיפול הפסיכה עד הילד השלישי, בתמורה לביטול המימון לנשים מבוגרות המתකשות להרות. זאת על רקע הירידה המשמעותית בסיסכויים להרות מגיל 43.

למרות העלייה במספר טיפול הפסיכה הניתנים בישראל, חלה ירידה במספר הלידות המתרחשות בעקבותיהם. מחקר שנערך בקרב מボותחות קופת חולים מכבי, שעברו טיפול הפסיכיה במשך ארבע שנים, העלה כי גיל הנשים העובדות את הטיפולים עלה, וכי בתקופה זו חלה עלייה של כ-50% במספר הטיפולים הניתנים. במקביל, התברר כי חלה ירידה של 21% בשיעורי הצלחה של הטיפולים, וכי סיון כויהם להצלחה הולכים וירדים במידה ניכרת בקרב נשים שגילן 40 ומעלה.

במחקר, המתפרסם בחודש בביטאון הסתדרות הרפואית "הרפואה", נבדקו 6,951 ילדים שנולדו בשנים 2007 עד 2010 ולמボותחות מכבי בעקבות טיפול לי הפסיכה, המהווים 4.5% מכלל הלידות בקופה. לאורך השנים אוביינחה עלייה של שנה אחת בגיל הממוצע של נשים שנזקקו לטיפול הפסיכה, מ-35 ל-36. מספר טיפול הפסיכה שבוצעו בכל שנה זינק מ-6,369 ב-2007 ל-9,525 ב-2010. לצד העלייה במספר הטיפולים, שכלו טיין פול בהורמוני ושייכת ביציות, ירדו שיעורי הצלחה במרוצת השנים. כך, בעוד שב-2007 היו 18.8% הצלחה בלידות מתוק כלל מחוזרי טיפול הפסיכה, ב-2008 היו 18.2% הצלחה. מגמת הירידה נשכחה ב-2009, בה היו 16.2% הצלחה וכן ב-2010, בה דוחה על 14.8% הצלחה.

ד"ר קול: "יש נשים שממשיכות יותר מ-20 מחוזרים של טיפול והצלחתן פוחתת"

בטיפול הפסיכה שכלו החזרת ביציות מופרות, שהופשו לאחר שהוקפאו במחוזרי טיפול קודמים, אף הושגו שיעורי הצלחה נמוכים יותר: מ-16.2% הצלחה ב-2007 ועד ל-13.4% ב-2010, ירידה של 17%. לשם השוואה, שיעורי ההצלחה המדויקים של הטיפולים בארה"ב להה מרידת גבויים פי 2.4 ועומדים על 61,426 תנוקות מתוק מ-148,055 מחוזרי טיפול ב-2008, וב-41% הצלחה. כך עלה מנתוני המרכז האמריקאי לבקרת מחלות (CDC).